

# ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА А

Вакцина против гепатита А защищает вашего ребёнка от вируса гепатита А, который вызывает инфекционное заболевание печени. (1)

Вирус гепатита А передаётся от человека человеку или через заражённые пищу и воду. Он может вызвать повышение температуры, усталость, потерю аппетита, тошноту, рвоту, сильные боли в животе, диарею, боли в суставах и желтуху, которые могут продолжаться 2-6 месяцев. Тяжёлое течение болезни может привести к печёночной недостаточности и смерти. (1)



У детей может не быть симптомов, но они могут быть распространителями инфекции. Вспышки гепатита А лучше всего подлежат контролю в тех местах, где вакцинируют детей. (1,2)

Дети с вирусом гепатита А выделяют вирус в своих каловых массах. Взрослые могут заразиться, когда они меняют загрязнённые подгузники и недостаточно тщательно моют руки. (2)



Чтобы обеспечить длительную защиту врачи рекомендуют делать 2 прививки с интервалом не менее 6 месяцев. (1)

Возможные побочные эффекты: болезненность или покраснение в месте укола, субфебрильная температура, головная боль или усталость. (1)



FACEBOOK.COM/BOOSTOREGON



@BOOSTOREGON



BOOSTOREGON

[WWW.BOOSTOREGON.ORG](http://WWW.BOOSTOREGON.ORG)

1) American Academy of Pediatrics <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/immunizations/Pages/Hepatitis-A-Vaccine-What-You-Need-to-Know.aspx>  
2) Children's Hospital of Philadelphia <https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-details/hepatitis-a-vaccine>