

LA VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A

La vacuna contra la hepatitis A protege a su hijo del virus de hepatitis A que causa infección hepática.⁽¹⁾

El virus de hepatitis A se transmite entre personas, o en alimentos y agua contaminados. Puede causar fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náusea, vómitos, dolores severos de estómago, diarrea, dolores en las articulaciones o ictericia que pueden durar de 2 a 6 meses. La enfermedad grave puede causar insuficiencia hepática y muerte. ⁽¹⁾




Los niños pueden no tener síntomas, pero pueden transmitir la infección. Los brotes de hepatitis A se controlan mejor en lugares donde los niños se vacunan habitualmente. ^(1,2)

Los bebés infectados con el virus de hepatitis A excretan el virus en sus heces. Es probable que los adultos que cambian los pañales contaminados se infecten si no se lavan las manos adecuadamente. ⁽²⁾



Los médicos recomiendan 2 dosis administradas con al menos 6 meses de diferencia para proporcionar una protección duradera. ⁽¹⁾

Los posibles efectos secundarios son dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección, fiebre leve, dolor de cabeza o cansancio. ⁽¹⁾



FACEBOOK.COM/BOOSTOREGON



@BOOSTOREGON



BOOSTOREGON

WWW.BOOSTOREGON.ORG

1) American Academy of Pediatrics <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/immunizations/Pages/Hepatitis-A-Vaccine-What-You-Need-to-Know.aspx>
2) Children's Hospital of Philadelphia <https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-details/hepatitis-a-vaccine>