

# ВАКЦИНА ПРОТИ ГЕПАТИТУ А

Вакцина проти гепатиту А захищає вашу дитину від вірусу гепатиту А, який викликає інфекційне захворювання печінки. (1)

Вірус гепатиту А передається від людини до людини або через заражену їжу й воду. Він може викликати підвищення температури, втому, втрату апетиту, нудоту, блювання, сильний біль у животі, діарею, біль у суглобах і жовтяницю, що можуть тривати від 2 до 6 місяців. Важкий перебіг хвороби може спричинити печінкову недостатність і смерть. (1)




В дітей хвороба може протікати безсимптомно, але вони можуть переносити інфекцію. Спалахи гепатиту А найкраще вдається тримати під контролем у місцях, де діти регулярно проходять вакцинацію. (1,2)

У малих дітей, заражених вірусом гепатиту А, вірус виділяється разом з каловими масами. Дорослі ризикують заразитися вірусом, якщо після зміни підгузку з зараженими каловими масами ретельно не поміють руки. (2)



**Лікарі радять** пройти 2 вакцинації з проміжком хоча би півроку, щоби забезпечити довготривалий захист. (1)

**Можливі побічні ефекти:** біль або почервоніння в місці ін'єкції, невелике підвищення температури, головний біль або втома. (1)



FACEBOOK.COM/BOOSTOREGON



@BOOSTOREGON



BOOSTOREGON

**WWW.BOOSTOREGON.ORG**

1) American Academy of Pediatrics <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/immunizations/Pages/Hepatitis-A-Vaccine-What-You-Need-to-Know.aspx>  
2) Children's Hospital of Philadelphia <https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-details/hepatitis-a-vaccine>