

Менингококковые вакцины

Существуют две менингококковые вакцины, которые защищают от пяти типов менингита. (1)

Менингококковая инфекция вызывает менингит (воспаление слизистой оболочки мозга) или сепсис (инфекция кровотока). Она распространяется через тесный контакт с зараженным человеком. Симптомы менингита могут включать ригидность затылочных мышц, головную боль, повышение температуры и сонливость.

Симптомы сепсиса могут включать повышение температуры, шок и кому. Болезнь прогрессирует очень быстро и может нанести серьезный вред здоровому ребенку всего за несколько часов. (1,2)

Врачи рекомендуют 2 дозы прививки MenACWY в возрасте 11-12 и 16 лет.

Поговорите с врачом вашего ребенка о прививке вакциной от менингококка В (MenB): В зависимости от факторов риска могут быть рекомендованы 2 дозы прививки в возрасте 16-18 лет. (1)



Возможные побочные эффекты: покраснение или болезненность в месте инъекции или небольшая температура. (1)



FACEBOOK.COM/BOOSTOREGON



@BOOSTOREGON



BOOSTOREGON

WWW.BOOSTOREGON.ORG

1) American Academy of Pediatrics <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/immunizations/Pages/Meningococcal-Vaccines-What-You-Need-to-Know.aspx>

2) Children's Hospital of Philadelphia <https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-details/meningococcal-vaccine>