

Las vacunas contra el meningococo

Hay dos vacunas contra el meningococo que protegen contra cinco tipos de meningitis. (1)

La enfermedad meningocócica causa meningitis (inflamación del revestimiento del cerebro) o sepsis (infección de sangre). Se transmite por contacto cercano con una persona infectada. Los síntomas de la meningitis pueden incluir rigidez de cuello, dolor de cabeza, fiebre y somnolencia. Los síntomas de sepsis pueden incluir fiebre, shock y coma. La enfermedad progresa muy rápidamente y puede dañar gravemente a un niño sano en sólo unas pocas horas. (1,2)

Los médicos recomiendan

2 dosis de la vacuna MenACWY a los 11-12 y 16 años. Hable con el médico de su hijo sobre la vacuna MenB:

Dependiendo de sus factores de riesgo, se pueden recomendar 2 dosis a los 16-18 años. (1)



Los posibles efectos secundarios son enrojecimiento o dolor en el lugar de la inyección o fiebre leve. (1)



FACEBOOK.COM/BOOSTOREGON



@BOOSTOREGON



BOOSTOREGON

WWW.BOOSTOREGON.ORG

1) American Academy of Pediatrics <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/immunizations/Pages/Meningococcal-Vaccines-What-You-Need-to-Know.aspx>

2) Children's Hospital of Philadelphia <https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-details/meningococcal-vaccine>