

Вакцини проти менінгококу


Існують дві менінгококові вакцини, які захищають від п'яти типів менінгіту. (1)

Менінгококова інфекція викликає менінгіт (запалення мозкових оболонок) або сепсис (інфекція крові). Вона поширюється при тісному контакті з інфікованою людиною. Можливі симптоми менінгіту: ригідність м'язів шиї, головний біль, підвищення температури та сонливість. Можливі симптоми сепсису: підвищення температури, шок і кома. Хвороба прогресує дуже швидко і може серйозно нашкодити здоровій дитині всього за кілька годин. (1,2)

Лікарі рекомендують 2 дози вакцини MenACWY у віці 11-12 та 16 років. Порадьтеся з лікарем вашої дитини щодо вакцини MenB: Залежно від особистих факторів ризику для здоров'я дитини їй можуть порадити 2 дози вакцини в віці 16-18 років. (1)



Можливі побічні ефекти: почервоніння або біль у місці ін'єкції, або незначне підвищення температури. (1)



FACEBOOK.COM/BOOSTOREGON



@BOOSTOREGON



BOOSTOREGON

WWW.BOOSTOREGON.ORG

1) American Academy of Pediatrics <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/immunizations/Pages/Meningococcal-Vaccines-What-You-Need-to-Know.aspx>

2) Children's Hospital of Philadelphia <https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-details/meningococcal-vaccine>