

Вакцина АКДС

Вакцинация АКДС защищает подростков и взрослых от столбняка, дифтерии и коклюша. (1)

Бактерии столбняка проникают в тело через порезы или раны. Это вызывает болезненное напряжение мышц и в 2-х из 10-и случаев приводит к смерти.

Дифтерия передается от человека к человеку и может приводить к проблемам с дыханием, параличу, сердечной недостаточности или смерти.

Бактерия коклюша вызывает сильный кашель, из-за которого трудно дышать, есть или спать. У подростков и взрослых это может привести к потере веса, недержанию мочи и к переломам ребер. Заболевание также может привести к пневмонии или смерти. (1,2)



Врачи рекомендуют одну дозу в возрасте 11 или 12 лет. Люди, которые не получили прививку в этом возрасте, должны получить её как можно скорее. Вакцинация АКДС особенно важна для тех, кто находится в тесном контакте с детьми младше 12-и месяцев. (2)

«Если мой ребенок получил вакцину КДС в 12 месяцев, зачем ему вакцина АКДС через 10 лет?»

КДС вакцинация проводится детям в возрасте до 7-и лет, а вакцина АКДС, в которой уменьшены дозы вакцин против дифтерии и коклюша, одобрена для подростков, начиная с возраста 11-и лет. Иммуитет ослабевает со временем, поэтому каждые десять лет нужна дополнительная прививка. (2)

Возможные побочные эффекты: боль, отёк или покраснение в месте укола, головная боль, усталость, боли в теле или умеренное повышение температуры. (1)



FACEBOOK.COM/BOOSTOREGON



@BOOSTOREGON



BOOSTOREGON

WWW.BOOSTOREGON.ORG

1) Children's Hospital of Philadelphia: <https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-details/diphtheria-tetanus-and-pertussis-vaccines>

2) American Academy of Pediatrics: <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/immunizations/Pages/Tetanus-Diphtheria-Pertussis-Tdap-Vaccine-What-You-Need-to-Know.aspx>