

# Вакцина АКДП-м

Вакцина АКДП-м захищає підлітків і дорослих від правця, дифтерії та кашлюку.<sup>(1)</sup>

**Правець** потрапляє в організм через порізи та поранення. Він викликає болючі спазми м'язів і до 2 випадків із 10 призводить до смерті.

**Дифтерія** передається від людини людині й може спричинити проблеми з диханням, параліч, серцеву недостатність або смерть.

**Коклюш** (кашлюк) спричинює сильний кашель, внаслідок чого немовлятам і дітям важко їсти, пити або дихати. Як у підлітків, так і в дорослих він може спричинити втрату ваги, нетримання та переломи ребер. Це також може призвести до пневмонії або смерті.<sup>(1,2)</sup>



**Лікарі радять** одну дозу вакцини у віці 11 або 12 років. Людям, які не пройшли вакцинацію в цьому віці, необхідно зробити це якнайшвидше. Особливо важливо отримати щеплення вакциною АКДП-м тим, хто має тісний контакт з дітьми молодше 12 місяців. <sup>(2)</sup>

**Можливі побічні ефекти:** біль, набряк або почервоніння у місці ін'єкції, головний біль, втома, біль у тілі або незначне підвищення температури.<sup>(1)</sup>

*"Якщо моя дитина пройшла вакцинацію АКДП у віці 12 місяців, навіщо їй щеплення вакциною АКДП-м 10 років потому?"*

Діти отримують щеплення вакциною АКДП у віці до 7 років, а вакцину АКДП-м із меншим вмістом антигенних компонентів дифтерії та коклюшу, затверджений для підлітків починаючи з 11 років. З часом імунітет слабшає, тому ревакцинація потрібна кожні десять років.<sup>(2)</sup>



FACEBOOK.COM/BOOSTOREGON



@BOOSTOREGON



BOOSTOREGON

**WWW.BOOSTOREGON.ORG**

1) Children's Hospital of Philadelphia: <https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-details/diphtheria-tetanus-and-pertussis-vaccines>

2) American Academy of Pediatrics: <https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/immunizations/Pages/Tetanus-Diphtheria-Pertussis-Tdap-Vaccine-What-You-Need-to-Know.aspx>